DLP-2-12-86014618

Avertissements agricoles Auvergne & Limousin ®

SPV

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 15 Octobre 1986

n°17

C O L Z A : CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL
Intervenir du 18 au 25 Octobre.

CEREALES : Attention au pucerons sur les parcelles levées.

COLZA

Stades (4 feuilles B4) à (6 - 8 feuilles B6 - B8

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

★ Situation

Les captures en cuvettes jaunes se poursuivent actuellement mais à un faible niveau.

L'observation des femelles du charançon nous indiquent que les oeufs sont bien formés.

★ Préconisation

Intervenir contre ce ravageur du 18 au 25 Octobre en utilisant un pyréthrinoïde à la dose Grosse Altise.

Consulter la fiche couleur parue avec notre bulletin n° 15 du 24/09/1986.

Pour les parcelles ayant reçu un microgranulé au semis, prévoir aussi un traitement.

MALADIES

★Situation

. Taches de Pseudocercosporella dans l'ALLIER.

. Mildiou dans de nombreuses parcelles.

★Préconisation

Aucune intervention ne se justifie.

_ N° de série : 529
_ SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
RN 89 Marmilhat
63 370 LEMPDES

_ Publication périodique
_ Directeur-Gérant : B. MORIN
_ CPPAP N° 525 AD - Abonnemt Annuel : 120 F
_ Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.
_ Imprimerie D. R. A. F.

P53

CEREALES

Stade (Levée à 2 feuilles
) Pour les premières parcelles d'orge
(semées début Octobre, notamment
) dans l'ALLIER.

PUCERONS VECTEURS DE LA JAUNISSE NANISANTE

★ Situation

Des TESTS ELISA ont été effectués sur des repousses de céréales vers le 10 Octobre (prélèvement de 10 plantes porteuses de pucerons).

Les premiers résultats sont les suivants :

LIEU		Nombre de plantes positives sur 10	Virulence
CHAZELLES	(63)	2	Forte
CHASSENET	(63)	0	-
SEYCHALLES	(63)	1	Faible
BEAUREGARD-L'EVEQUE	(63)	3	Faible
LEMPDES	(63)	0	-
PARDINES	(63)	0	-

Actuellement, on assiste à une colonisation des jeunes céréales levées.

Les infestations de pucerons notées dans l'ALLIER varient de 15 à 45 %.

★ Préconisation

- Eliminer rapidement les repousses.

- Pour les parcelles levées actuellement, une intervention insecticide se justifie si plus de 15 à 20 % des plantes sont colonisées.

Utiliser un pyréthrinoïde à sa dose homologuée.

Il semble toutefois que le risque Jaunisse soit faible à l'analyse des résultats des Tests Elisa sur repousses.